

# Intervenção farmacológica na cessação tabágica

Em pessoas com dependência de álcool



## TABAGISMO

é responsável por:

**8 MILHÕES**  
MORTES/ANO

no **MUNDO**

**13.000 em Portugal**



Segundo a OMS, existem

**50** Doenças associadas ao tabagismo:

Doenças Cardiovasculares  
Doenças Respiratórias  
+20 tipos diferentes de cancro



Estudos indicam que o tabagismo está associado ao consumo excessivo de álcool




Os medicamentos para parar de fumar também demonstraram reduzir o consumo de álcool



## População em estudo

**908** fumadores com dependência de álcool




= 100

= 50

= 8

## Eficácia na Cessação Tabágica Em pessoas com dependência de álcool



**Nota:** Os valores correspondem ao odds ratio, que representa a probabilidade de cada medicamento demonstrar eficácia na cessação tabágica em alcoólicos.

## Resultados

Em comparação com o grupo controlo...

**Vareniclina** ✓

Tem um efeito significativo na cessação do tabagismo a curto prazo (<12 semanas).

**Naltrexona** ✗

Não tem efeito significativo na cessação do tabagismo a curto prazo ou a longo prazo.

**Topiramato e Bupropiona** ✗

Não tiveram efeito significativo na cessação do tabagismo.