


EFEITO DA TOMA SEMANAL CONTÍNUA DE SEMAGLUTIDO SUBCUTÂNEO VS PLACEBO NA MANUTENÇÃO DA PERDA DE PESO EM ADULTOS COM EXCESSO DE PESO OU OBESIDADE

OBJETIVO

Comparação do tratamento contínuo a partir das 20 semanas com 2,4mg de semaglutido subcutâneo versus placebo, com manutenção do peso e intervenção no estilo de vida em adultos com excesso de peso ou obesidade.


POPULAÇÃO



169 634

- Adultos com IMC ≥ 30 (ou ≥ 27 com ≥ 1 comorbilidade relacionada com o peso)
- Sem diabetes
- Média de idades: 46 anos
- Média de perímetro abdominal: 115.3 cm
- Situados em 10 países

INTERVENÇÃO



RESULTADOS

Média da diferença de peso da 20ª até à 68ª semana:



CONCLUSÃO

Após completarem as 20 semanas de tratamento com Semaglutido, os adultos com excesso de peso ou obesidade perderam peso ao continuarem a sua terapêutica com Semaglutido 1x por semana, durante 48 semanas, comparativamente com o grupo em que era administrado placebo.

BIBLIOGRAFIA

Rubino D, Abrahamsson N, Davies M, et al. Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 4 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;325(14):1414-1425.