



DA DESCOLORAÇÃO POR TRAUMATISMO À ESTÉTICA

Pombo Lopes, J.^{1,2,3}, Colaço, C.^{1,4}, Carvalho, R.^{1,2,3}, Alexandre, B.^{1,4}, Meném, M.^{1,4}, Nobre, M.^{1,2,3}, Argolinha, I.^{1,2,3}, Rua, J.^{1,2,3}

1 - Egas Moniz School of Health & Science, 2829-511 Caparica, Almada, Portugal

2 - Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research (CiEM); Egas Moniz School of Health & Science, 2829-511 Caparica, Almada, Portugal

3 - Mestrado Integrado em Medicina Dentária – Docente

4 - Mestrado Integrado em Medicina Dentária - MDFV

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO:

Paciente do sexo masculino, 40 anos, sem patologias sistémicas ou medicação a referir, manifesta insatisfação com a estética dentária do setor anterior. Clinicamente observou-se escurecimento do dente 11 e assimetria gengival nos incisivos centrais superiores, decorrentes de um traumatismo prévio. A realização da anamnese, avaliação clínica, fotográfica e radiográfica, conduziu a um plano de tratamento que integrou o tratamento endodôntico do dente 11, branqueamento dentário externo ambulatorio, gengivectomia e alongamento coronário associados ao dente 11 e colocação de coroas em zircónia nos dentes 11 e 21.



Figura 1 – Fotografia inicial intra-oral



Figura 2 – Chave de desgaste



Figura 3 – Preparos dentários



Figura 4 – Gengivectomia e alongamento coronário associados ao dente 11 e coroa provisória dentes 11 e 21



Figura 5 – Fotografia final intra-oral



A



B

Figura 6 – Comparação fotografias inicial (A) e final (B) extra-oral

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

As repercussões dos traumatismos dentários podem incluir alterações na coloração dentária, mobilidade, necrose pulpar e reabsorções ósseas e dentárias (1). O presente relato descreve o caso de um paciente que sofreu um trauma há vários anos e procurou atendimento médico-dentário tardio, quando o escurecimento dos dentes 11 e 21 já causava considerável desconforto. Os incisivos centrais superiores são descritos como os dentes mais frequentemente afetados por trauma dentário, devido à sua posição anatómica, sendo afetado mais comumente o sexo masculino (2). Seguindo o planeamento traçado, o tratamento endodôntico e o branqueamento dentário possibilitaram a melhoria da cor do substrato, a gengivectomia restabeleceu a simetria gengival e a realização de coroas em zircónia nos dentes 11 e 21 permitiu corrigir a estética e posição dos dentes anteriores, sendo proporcionada uma solução estética, previsível, duradoura e natural num curto espaço de tempo, oferecendo maior confiança e qualidade de vida ao paciente (3).

Referências Bibliográficas

