



# FADIGA E TONTURAS NUM IDOSO: O EFEITO INVISÍVEL DAS INTERAÇÕES

Auxtero, M.D.<sup>1\*</sup> and Tallón J.<sup>2</sup>


<sup>1</sup> Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research (CiiEM); Egas Moniz School of Health & Science, Campus Universitário, Quinta da Granja, 2829-511 Caparica, Almada, Portugal

<sup>2</sup> MSc in Pharmaceutical Sciences, Instituto Universitário Egas Moniz, Egas Moniz School of Health & Science, Campus Universitário, Quinta da Granja, 2829-511 Caparica, Almada, Portugal

\* Correspondence: mauxtero@egasmoniz.edu.pt

1

## APRESENTAÇÃO DO CASO



2

## SINTOMAS



FADIGA MATINAL



TONTURAS


## REVISÃO TERAPÊUTICA

Observam-se interações metabólicas:

Omeprazol reduz a depuração da fluoxetina => intensifica efeitos adversos centrais, como **fadiga ou confusão**.

Fluoxetina, Omeprazol e DHA inibem CYP3A4 => aumenta a concentração da simvastatina => **risco de mialgias e hepatotoxicidade**.

3 DISCUSSÃO



4

## CONCLUSÃO

O PRESENTE CASO CLÍNICO REALÇA A IMPORTÂNCIA DA MONITORIZAÇÃO DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM IDOSOS POLIMEDICADOS.