Hidroxicloroquina e segurança farmacoterapêutica numa doente com manifestações oculares e cutâneas

Silva, M.[1] ; Auxtero, M.D.[2]

[1] BSc in Pharmaceutical Sciences, Instituto Universitário Egas Moniz, Egas Moniz School of Health & Science, Campus Universitário, Quinta da Granja, 2829-511 Caparica, Almada, Portugal

[2] Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research (CiiEM); Egas Moniz School of Health & Science, Campus Universitário, Quinta da Granja, 2829-511 Caparica, Almada, Portugal

66 anos
Mulher · artrite e hipotiroidismo

66 kg
Peso corporal registado

400 mg/dia
Hidroxicloroquina mantida

6,1 mg/kg/dia
Referência: ≤ 5 mg/kg/dia

ENQUADRAMENTO
A utilização prolongada de hidroxicloroquina requer vigilância, particularmente pelo risco de retinopatia.

OBJETIVO
Identificar riscos da terapêutica e problemas de administração, perante manifestações oculares e cutâneas.

Caso clínico

Mulher, 66 anos (66 kg)
Artrite e hipotiroidismo

Hidroxicloroquina 400 mg/dia
Rosuvastatina
Prednisolona
Levotiroxina 50 µg/dia

DOSE DE HIDROXICLOROQUINA

400 ÷ 66 = 6,1 mg/kg/dia

Achados relevantes

Oftalmologia
Sem avaliação oftalmológica; fotofobia anterior ao tratamento.

Pele
Manchas cutâneas de cronologia não esclarecida.

Levotiroxina e café
Cerca de sete cafés/dia; intervalo indefinido; TSH desconhecida.

Riscos e incertezas

Retinopatia
Dose acima da referência para utilização prolongada; não foi diagnosticada retinopatia.

Manifestações cutâneas
Sem causalidade ou sinergia fotossensibilizante estabelecidas.

Absorção da levotiroxina
Pode estar comprometida pela proximidade do consumo de café.

Intervenções propostas · ESPIEM

Avaliação oftalmológica
Avaliação inicial e vigilância

→

Revisão médica
Reavaliar a dose de hidroxicloroquina

→

Caracterização cutânea
Esclarecer as manchas referidas

→

Aconselhamento
Levotiroxina em jejum; separar do café

CONCLUSÃO

O ESPIEM identificou a necessidade de avaliação oftalmológica, revisão da dose de hidroxicloroquina, caracterização das manifestações cutâneas e aconselhamento sobre a administração da levotiroxina.